

Informacja o wystąpieniu ognisk choroby zakaźnej pszczoł

Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczoł, część gminy Orzesze została ogłoszona terenem zapowietrzonym, tj. terenem występowania choroby.

Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r. „w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczoł na terenie miast Ruda Śląska i Tychy oraz powiatów gliwickiego i mikołowskiego” - poz. 6211, część gminy Orzesze została ogłoszona terenem zapowietrzonym, tj. terenem występowania choroby. Jest to północno-wschodni obszar gminy ograniczony od południa wzdłuż ulic Tyskiej, Pszczyńskiej, Mikołowskiej, Gliwickiej, Pocztowej, Miłej i Skośnej.

W obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

- 1) przemieszczania, bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rodzin pszczelich, pszczoł, matek pszczelich, czerw, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece;
- 2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczoł.

Zakazy określone w rozporządzeniu dotyczą wszystkich posiadaczy pszczoł z obszaru zapowietrzonego i obowiązują do czasu uchylecia niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem teren zapowietrzony zostanie właściwie oznakowany. Chcemy jednocześnie uspokoić mieszkańców, że choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ludzi.

Dodatkowe informacje dla pszczelarzy:

Zgnilec amerykański jest wysoce zaraźliwą chorobą bakteryjną pszczoł. Zarazek atakuje larwy i czerw powodując ich zamarcie. Za jego rozprzestrzenianie w ulu odpowiedzialne są robotnice opiekujące się czerwem i czyszczące komórki plastra, natomiast rozprzestrzenianie choroby pomiędzy ulami ma głównie miejsce u schyłku lata i początku jesieni, kiedy w okresie bezpożytkowym występują rabunki słabych rodzin pszczelich (m. in. zakażonych).

Należy mieć również na względzie możliwość przenoszenia drobnoustroju przez osoby opiekujące się pszczołami, które nie zachowują należytej higieny pracy. Wczesnym niepokojącym objawem są zmiany na zasklepkach komórek z martwym czerwem, wieczka tych komórek są pociemniałe i zapadnięte, występuje tzw. czerw rozstrzelony. Po odkryciu komórek w zależności od postępu choroby można zaobserwować etapowe przekształcanie się zamartłego czerw w brązową ciągnącą się masę, która przylega do ścian komórek plastra. Objawom tym, towarzyszy wydzielany zapach spalonego rogu.

Rozpoznanie choroby odbywa się poprzez obserwację objawów, gdzie w przypadku podejrzenia pobierane są próby do badań laboratoryjnych. W tym celu zaleca się kontakt z Inspekcją Weterynaryjną lub najbliższym lekarzem weterynarii. Do badań pobiera się wycinki plastra o powierzchni co najmniej 20 cm zawierający w komórkach jak najwięcej chorobowo zmienionego lub martwego czerw.

Celem zwalczania ogniska choroby po wcześniejszej likwidacji mocno zainfekowanych pni pszczelich należy przeprowadzić dokładne oczyszczanie i odkażanie uli, sprzętu, za pomocą środków fizycznych np. opalenie płomieniem lampy benzynowej lub gazowej, lub przy użyciu dopuszczonych produktów biobójczych np. zawierających podchloryn sodu jako substancję czynną. Takie działania są niezbędne gdyż przetrwalniki bakterii zgnilca są odporne na działanie czynników środowiskowych i powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne. Należy pamiętać, że wyżej wymienione czynności wykonywane są wyłącznie przez lekarzy weterynarii pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii.